

Multi-Gyn® IntiSkin

- Lindert sofort Hautreizungen, Juckreiz, Rötungen und Brenngefühl der Haut im äusseren Intimbereich
- Spendet Frischegefühl
- Beseitigt Gerüche
- Spray 360°
- Ideal nach dem Rasieren und Epilieren



NEU!

Multi-Gyn® IntiFresh

- Sofortiges und langanhaltendes Frischegefühl
- Extrem sanft
- Dermatologisch getestet
- Viskosefrei, 100% biologisch abbaubar und in die Toilette wegwerfbar
- Parabenfrei
- Ideal auf Reisen, am Arbeitsplatz, nach dem Sport...



Multi-Gyn®

Umfassendes Produktsortiment gegen weitverbreitete Vaginalprobleme

- Wiederherstellung eines idealen Vaginalmilieus
- Förderung einer gesunden Vaginalflora
- Dem vaginalen pH-Wert angepasst
- Natürliche und milde Produkte
- Optimale Wirksamkeit dank Auswahl des richtigen Produkts (Zuordnung der Produkte zu einzelnen Problemen)
- Einfache Anwendung
- Rasche Linderung der Symptome
- Auf 2QR-Basis (gegen pathogene Bakterien stark antiadhäsiv wirksam)
- Prebiotischer Effekt mit Multi-Gyn® FloraPlus

Multi-Gyn® ...

... von Gynäkologen erdacht, von Frauen geschätzt

Das Multi-Gyn-Produktsortiment:

Multi-Gyn ActiGel 50 ml (CHF 23.70)

Multi-Gyn FloraPlus 5 Einwegtuben (CHF 23.70)

Multi-Gyn CombiPack Vaginaldusche + Brausetabletten (CHF 28.60)

Multi-Gyn Brausetabletten 10 St. (CHF 13.75)

Multi-Gyn FemiWash 100 ml (CHF 14.85)

Multi-Gyn LiquiGel 30 ml (CHF 17.70)

Multi-Gyn IntiFresh (neu) Fächttücher 12 St. (CHF 4.90)

Multi-Gyn IntiSkin (neu) Spray 40 ml (CHF 13.00)

Multi-Gyn®

Umfassendes
Produktsortiment
gegen weitverbrei-
tete Vaginalprobleme



HYGIS 2015 – Guide



Vertrieb in der Schweiz:
HYGIS SA, 1136 Bussy
www.multi-gyn.ch



Verwendungsübersicht des Produktsortiments

Indikationen	Vorgehen	Bemerkungen
PROBLEM		
Vaginale Bakteriose	An 5 aufeinanderfolgenden Tagen morgens und abends eine Vaginaldusche mit der Multi-Gyn Vaginaldusche und den Brause-tabletten durchführen. Nach jeder Vaginaldusche Multi-Gyn ActiGel verwenden.	Bei häufigen Rezidiven siehe «Vorbeugung von vaginalinfektionen».
Vaginalmykose	An 5 aufeinanderfolgenden Tagen morgens und abends eine Vaginaldusche mit der Multi-Gyn Vaginaldusche und den Brause-tabletten durchführen. Abends nach der Vaginaldusche Multi-Gyn FloraPlus verwenden. Bei anhaltenden Beschwerden wenden Sie sich bitte an Ihren Arzt oder Ihre Ärztin.	Vaginalmykose ist sehr häufig rezidivierend. Bei einem Rezidiv siehe «Vorbeugung von vaginalinfektionen». Bei starken Rötungen und starkem Juckreiz Multi-Gyn ActiGel verwenden.
Vulvodynie	Multi-Gyn ActiGel nach Belieben verwenden.	
Vaginale Trockenheit, schmerzhafter Geschlechtsverkehr	Multi-Gyn LiquiGel nach Belieben und vor dem Geschlechtsverkehr verwenden. Auch Multi-Gyn FloraPlus kann verwendet werden.	Paare mit Kinderwunsch: Während der fruchtbaren Zeit Multi-Gyn nicht verwenden.
Wiederherstellung des Gleichgewichts der Vaginalflora	Multi-Gyn FloraPlus jeden 3. Tag vor dem Zubettgehen verwenden.	
VORBEUGUNG		
Vorbeugung von vaginalen Infektionen	Multi-Gyn ActiGel und/oder Multi-Gyn FloraPlus jeden 3. Tag verwenden (täglich während der Antibiotikatherapie). Zur Vorbeugung von rezidivierender Candidose wird Multi-Gyn FloraPlus empfohlen, das dank seinem probiotischen Effekt die Vermehrung der Laktobazillen fördert.	Antibiotika beeinträchtigen die Vaginalflora stark. Multi-Gyn ActiGel und Multi-Gyn FloraPlus helfen bei der Wiederherstellung einer gesunden Vaginalflora.
Vorbeugung von vaginalen Infektionen, die man sich im Schwimmbad oder Sprudelbad zuzieht	Vor dem Besuch des Schwimm- oder Sprudelbads Multi-Gyn ActiGel verwenden. Nach dem Besuch im Bad wiederholen. Während der Badesaison Multi-Gyn FloraPlus einmal wöchentlich verwenden.	Nach dem Bad kann man auch eine Vaginaldusche mit der Multi-Gyn Vaginaldusche und den Brause-tabletten durchführen, bevor man Multi-Gyn ActiGel verwendet.
Vorbeugung von vaginalen Infektionen in der Schwangerschaft	Multi-Gyn ActiGel und/oder Multi-Gyn FloraPlus jeden 3. Tag verwendet. Mindestens einmal wöchentlich und nach dem Geschlechtsverkehr eine Vaginaldusche mit der Multi-Gyn Vaginaldusche und den Brause-tabletten durchführen.	Rezidivierende vaginalinfektionen während der Schwangerschaft sind eine der wichtigsten Ursachen für Frühgeburten. Sobald sich der Muttermund öffnet oder Fruchtwasser austritt, keine Vaginalduschen und Bäder mehr durchführen.
WOHLBEFINDEN		
Reizungen, Rötungen, Juckreiz usw.	Multi-Gyn ActiGel nach Belieben verwenden. Benutzen Sie Multi-Gyn IntiSkin bei Reizung und Rötung der Bikinizone.	Zu beachten: Bei starker Reizung kann einige Sekunden lang ein Brennen verspürt werden. Dies ist normal und liegt an der pH-Verschiebung.
Geruch, Ausfluss ohne Infektion	2-mal täglich eine Vaginaldusche mit der Multi-Gyn Vaginaldusche und den Brause-tabletten durchführen bis zum Abklingen der Symptome.	Nach der Verwendung der Multi-Gyn Vaginaldusche und der Brause-tabletten immer Multi-Gyn FloraPlus verwenden, um das Gleichgewicht der Vaginalflora wiederherzustellen.
Äusserliche Intimhygiene	Für optimale Hygiene nach der Toilette, Multi-Gyn IntiFresh .	Nie Produkte verwenden, die Seife, Duftstoffe, Desinfektionsmittel, Farbstoffe oder andere allergene Substanzen, wie zum Beispiel Konservierungsmittel, enthalten.
Hygiene im Innern der Vagina	Für die übliche Intimhygiene einmal wöchentlich eine Vaginaldusche mit der Multi-Gyn Vaginaldusche und den Brause-tabletten durchführen. Besonders anfällige Frauen führen jeden 2. Tag eine Vaginaldusche durch und verwenden einmal wöchentlich Multi-Gyn FloraPlus .	Multi-Gyn Duschseife und Brause-tabletten , nach ungeschütztem Verkehr angewendet, reduzieren das Infektionsrisiko empfindlicher Personen.
Intimirasur und Haarentfernung	Multi-Gyn FemiWash als Rasierschaum verwenden und Multi-Gyn IntiSkin nach der Rasur oder Haarentfernung.	
Paare mit Kinderwunsch	Nach dem Geschlechtsverkehr 6 Std. warten, um eine Vaginaldusche vorzunehmen oder um ein Multi-Gyn-Produkt intern anzuwenden.	